

Examen Wiskunde II
1ste bachelor Geografie
maandag 7 juni 2010, 8:30–11:30

Naam:

Studierichting:

Naam assistent(en):

- Het examen bestaat uit 4 vragen. Elke vraag telt even zwaar mee.
- Geef uw antwoorden in volledige, goed lopende zinnen. Schrijf de antwoorden op deze bladen en vul eventueel aan met losse bladen.
- U mag gebruik maken van de cursus (Wiskunde I én Wiskunde II; géén extra toegevoegde bladen) en van een rekenmachine (grafisch is toegestaan, een symbolisch niet).
- Schrijf de antwoorden duidelijk leesbaar op in goede Nederlandse zinnen. Begin het antwoord op elke vraag op een nieuw blad. Vermeld uw naam op elk blad.
- Vermeld op dit blad ook de naam van uw assistent(en) (Simon Allewaert, Carla Jacobs, Eva Leenknecht, Sven Raum, Kristof Schoels, of Johan Van Kerckhoven).
- Succes!

Naam:

Vraag 1 Zij A de matrix

$$A = (\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c})$$

met

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ p \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ p \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} p \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

en $p \in \mathbb{R}$.

- (a) Bereken de oppervlakte van het parallellogram dat opgespannen wordt door \vec{a} en \vec{b} .
- (b) Geef de oplossingen van het stelsel

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Voor welke p is het stelsel strijdig? Voor welke p zijn er oneindig veel oplossingen?

- (c) Voor welke p zijn de kolomvectoren van A onderling orthogonaal?

Hoe kunt u deze eigenschap gebruiken om de inverse matrix A^{-1} makkelijk uit te rekenen?

Antwoord:

Naam:

Vraag 2 De 2×2 matrix B heeft eigenwaarden $\lambda_1 = i$ en $\lambda_2 = -i$ met bijbehorende eigenvectoren

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \end{pmatrix} \quad (\text{bij eigenwaarde } i) \quad \text{en} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2i \end{pmatrix} \quad (\text{bij eigenwaarde } -i)$$

(a) Bereken B .

(b) Bereken B^{2010} .

Antwoord:

Naam:

Vraag 3 Een eenvoudig model voor de groei van tumoren wordt gegeven door de differentiaalvergelijking

$$\frac{dx}{dt} = -ax \ln\left(\frac{x}{K}\right)$$

waarin $x(t)$ de massa van het tumor is op tijdstip t . Hierin zijn $a > 0$ en $K > 0$ positieve constanten.

- (a) Los de differentiaalvergelijking op met beginwaarde $x(0) = x_0 > 0$.
- (b) Is de oplossing stijgend of dalend? Uw antwoord mag afhangen van de waarde van x_0 . Bestaat de limiet

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) ?$$

Antwoord:

Naam:

Vraag 4 Beschouw het stelsel van differentiaalvergelijkingen

$$\begin{aligned}x' &= -x \\ y' &= \sin(2x - y)\end{aligned}$$

- (a) Bereken de evenwichtspunten.
- (b) Onderzoek de stabiliteit van de evenwichten

Antwoord: